

Indice International de la Fonction Erectile (IIEF)

Au cours des 4 dernières semaines, lorsque la stimulation sexuelle a provoqué des érections, avec quelle fréquence votre pénis a été suffisamment rigide (dur) pour permettre la pénétration de votre partenaire ?

- [0] Je n'ai pas eu de stimulation sexuelle
- [5] Presque tout le temps ou tout le temps
- [4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
- [3] Quelquefois (environ la moitié du temps)
- [2] Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)
- [1] Presque jamais ou jamais

Au cours des 4 dernières semaines, pendant vos rapports sexuels, combien de fois avez-vous pu rester en érection après avoir pénétré votre partenaire ?

- [0] Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels
- [5] Presque tout le temps ou tout le temps
- [4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
- [3] Quelquefois (environ la moitié du temps)
- [2] Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)
- [1] Presque jamais ou jamais

Au cours des 4 dernières semaines, pendant vos rapports sexuels, à quel point vous a-t-il été difficile de rester en érection jusqu'à la fin de ces rapports ?

- [0] Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels
- [1] Extrêmement difficile
- [2] Très difficile
- [3] Difficile
- [4] Un peu difficile
- [5] Pas difficile

Au cours des 4 dernières semaines, lorsque vous avez essayé d'avoir des rapports sexuels, combien de fois a-t-il été satisfaisant pour vous ?

- [0] Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels
- [5] Presque tout le temps ou tout le temps
- [4] La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
- [3] Quelquefois (environ la moitié du temps)
- [2] Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)
- [1] Presque jamais ou jamais

Au cours des 4 dernières semaines, à quel point étiez-vous sûr de pouvoir avoir une érection et de la maintenir ?

- [5] Très sûr
- [4] Sûr
- [3] Moyennement, sûr
- [2] Pas très sûr
- [1] Pas sûr du tout

L'IIEF-5 reprend de l'IIEF quatre questions portant sur la fonction érectile (Q 2, 4, 5 et 15) et une question portant sur la satisfaction sexuelle (Q 7).

Ces cinq questions se sont révélées être plus discriminantes lorsqu'elles ont été posées aux hommes souffrant de DE et à ceux n'en souffrant pas.

En pratique clinique, l'IIEF-5 est utilisé quasi systématiquement dans la plupart des essais cliniques évaluant de nouvelles thérapies dans le traitement de la DE.

SCORE IIEF-5 :

SCORE = total des réponses aux 5 questions

26 à 30 : Absence de DE

22 à 25 : Dysfonction Erectile légère

17 à 21 : DE légère à modérée

11 à 16 : DE modérée

6 à 10 : DE sévère